

Örnek Sorular

Tip 1 soru: Bilginin pratikte kullanılmasına yönelik olanlar Kişinin bir sonuca varması, bir öngöründe bulunması veya atılacak adımlardan birini seçmesi...

1. 72 yaşında sigara içen bir erkek. Uzun süreli kontrolsüz hipertansiyonu var. Bir saattir bele yayılan şiddetli yırtıcı tarzda angina ile acile başvuruyor. Angina şiddetli olarak başlamış ve şiddeti hiç azalmamış. Ağrı için sublingual nitrogliserin alan hastada senkopa yakın tablo gelişmiş. Hastanın görünümü sinirli, soluk ve terli. Kan basıncı 160/100 mmHg ve nabız 110 vuru/dk. Juguler venöz dolgunluk yok. Sternum boyunca yayılan 2/6 şiddetinde decrescendo diyastolik üfürüm ve S4 var. Radyal nabızlar her iki kolda eşit. EKG' de II, III ve aVF'de 2 mm'lik ST elevasyonu var. Telededi mediasten genişlemiş.

Bu hasta için yapılacak ilk şey nedir?

- a. Ağızdan aspirin verip trombolitik tedaviye başlamak
 - b. Transözofageal eokardiyografi
 - c. İV propranolol başlanması
 - d. Sublingual 10 mg nifedipin
 - e. Primer angioplasti için hastayı kateter laboratuvarına taşımak
2. 15 yaşında bir kız okulda bayılıyor ve birkaç dakika içinde spontan düzeliyor. Hastanın kardiyak problemi yok. Asemptomatik ve çok iyi bir egzersiz kapasitesi var. 3 ay ve 10 ay önce yine bayılmış ve spontan iyileşmiş. Hastanın fizik muayene ve vital bulguları normal. EKG'sinde QT intervali uzun. Ekokardiyografisi normal.

Bu hasta için en uygun yapılacak şey nedir?

- a. Eletrofizyolojik çalışma
- b. Klinik gözlem
- c. Tilt-table testi
- d. Propranolol tedavisi
- e. Prokainamid tedavisi

Tip 2 soru: Önceden ezberlenmiş bilgileri hatırlatmaya yönelik sorulardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi class III antiaritmik ajandır?
 - a. Prokainamid
 - b. Lidokain
 - c. Amiodaron
 - d. Digoxin
 - e. Propranolol
4. Perikardite sebep olan en sık patojen ajan aşağıdakilerden hangisidir?
 - a. Mycobacterium tuberculosis

- b. Rotavirüsler
- c. Viridans streptokoklar
- d. Coxsackie virüsler
- e. Pnömonokoklar